

КлоксаМакс 600 (CloxaMax 600)

Cloxacillin

Масляная суспензия для интрацистернального применения в ветеринарии

Для крупного и мелкого рогатого скота

Состав

Каждые 10 мл содержат:

- **Клоксациллин натрия — 600 мг**

Вспомогательные вещества: вазелин, подсолнечное масло.

Внешний вид: масляная суспензия белого, желтоватого или кремового цвета с характерным запахом. При хранении возможно расслоение на фазы.

Фармакологические свойства

Активное вещество препарата — клоксациллина бензоат, бета-лактамный антибиотик группы пенициллинов. Обладает активностью в отношении грамположительных бактерий, включая устойчивые к пенициллину *S* стафилококки (*Staphylococcus aureus*), а также *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium anaccillustudo*, *Bacillus anthracis*, а также грамотрицательных микроорганизмов *Neisseria spp*.

Менее эффективен в отношении возбудителей *Escherichia coli* (*E. coli*) и *Klebsiella spp*.

Фармакокинетика

После интрацистернального введения активное вещество быстро распределяется по всей молочной железе. Антибиотик связывается с мембранными белками, называемыми пенициллин-связывающими белками (РВР), и оказывает бактерицидное действие.

Активное вещество практически не всасывается из молочной железы в системный кровоток, практически не подвергается биотрансформации и выводится преимущественно в неизменном виде с молоком.

Показания к применению

Препарат применяют для лечения острых и субклинических маститов у крупного и мелкого рогатого скота в период сухостоя, вызванных стрептококками, стафилококками и другими грамположительными бактериями, продуцирующими пенициллиназу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Побочные действия

При применении препарата в рекомендуемых дозах побочные реакции не наблюдаются.

Целевые виды животных

- Крупный рогатый скот.
 - Мелкий рогатый скот.
-

Способ применения и дозы

Препарат вводят интрацистернально.

Крупный рогатый скот (при переводе в сухостой)

Ввести один шприц (10 мл) в каждую четверть вымени однократно.

Мелкий рогатый скот

Ввести половину указанной дозы (5 мл) в каждую четверть вымени однократно.

Период ожидания

Мясо: 28 суток.

Молоко: не применять у животных, у которых период сухостоя составляет менее 4 недель, во избежание появления остаточных количеств препарата в молоке.

Особые предупреждения

Особые меры предосторожности при применении у животных

Препарат вводят сразу после начала сухостойного периода.

Перед введением необходимо полностью выдоить все четыре четверти вымени и обработать соски дезинфицирующим раствором.

Канюлю или наконечник инъектора осторожно ввести в сосковый канал и медленно ввести препарат.

После извлечения канюли зажать сосковый канал на 1–2 минуты.

Для лучшего распределения препарата после введения рекомендуется провести легкий массаж вымени.

Особые меры предосторожности для лиц, применяющих препарат

При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности при обращении с ветеринарными лекарственными средствами.

Лицам с известной повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать контакта с ним.

Избегать попадания препарата на кожу и в глаза.

Во время применения всегда использовать одноразовые защитные перчатки.

После окончания работы тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

Лекарственное взаимодействие

Не применять одновременно с другими бактериостатическими антибиотиками.

Передозировка

При применении препарата согласно инструкции передозировка маловероятна.

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте при температуре 15–25°C.

Срок годности: 3 года.

Утилизация

Не выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми отходами.

По вопросам утилизации неиспользованного препарата и/или его упаковки следует обратиться к ветеринарному врачу. Соблюдение данных требований способствует защите окружающей среды.

Форма выпуска

Однодозовый полиэтиленовый шприц объемом 10 мл.

Только для ветеринарного применения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Фармакотерапевтическая группа

Бета-лактамное антибактериальное средство, пенициллин для интрацестернального применения.

Код ATCvet: QJ51CF02 – Cloxacillin

Производитель

ООО «Биотекс»

Грузия, г. Тбилиси, ул. Иумашеви, 8.